

GYNOVASOL® LP 150 mg

Nitrate d'éconazole.

Ovules à libération prolongée.

FORME ET PRESENTATION :

Ovule à libération prolongée, boîte de 1.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Nitrate d'éconazole :150 mg,

Excipients : polysaccharide galactomannane, silice colloïdale anhydre, glycérides hémisynthétiques solides, heptanoate de stréaryle, pour un ovule.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : ANTI-INFECTIEUX ET ANTISEPTIQUES A USAGE GYNECOLOGIQUE.

DANS QUEL (S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement local des mycoses (affections dues à des champignons microscopiques) de la vulve et du vagin parfois surinfectées.

ATTENTION !

DANS QUEL (S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- en cas d'allergie à l'un des composants des produits à une substance apparentée,

- en cas d'utilisation avec un diaphragme en latex.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du traitement d'ensemble. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs favorisants par votre médecin est indispensable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser un savon acide pour l'hygiène locale (l'acidité favorisant la prolifération des champignons) (Cf. Conseils pratiques de la rubrique : Comment utiliser ce médicament ?)

- Ce traitement peut entraîner des sensations de brûlures locales et une augmentation des démangeaisons. Généralement, ces phénomènes cèdent spontanément à la poursuite du traitement. Si les symptômes persistent au-delà de 24 à 48 heures, interrompez le traitement et consultez votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne pas utiliser avec des produits spermicides (risque d'inactivation) ni avec un diaphragme en latex (risque de rupture du diaphragme).

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut

juger de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie :

Dans la majorité des cas, 1 ovule le soir au coucher, en administration unique.

Dans certains cas, votre médecin peut vous prescrire un ovule le soir et un ovule le lendemain matin.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie vaginale.

Introduire profondément l'ovule dans le vagin, de préférence en position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.

CONSEILS PRATIQUES :

- toilette avec un savon à pH neutre ou alcalin;
- afin de ne pas contaminer votre entourage, utilisez votre propre linge de toilette (gant, serviette),
- votre médecin pourra :
- Traiter également votre partenaire sexuel, afin d'éviter qu'il ne vous recontamine,
- Vous prescrire un antifongique à appliquer localement,

- portez des sous-vêtements en coton;

- évitez les douches vaginales;

- ne pas interrompre le traitement pendant les règles;

- évitez de porter des tampons internes pendant le traitement.

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUEL (S) LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE :

Ce produit doit être administré de préférence le soir au coucher.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

Comme tous les médicaments, **GYNOVASOL® LP 150 mg**, ovule à libération prnlongée est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- réactions au site d'application telle que sensations de brûlures, irritations, démangeaisons et érythème (rougeur de la peau),

- Dermatites de contact (inflammation de la peau) et urticaire.

Signaler à votre médecin ou pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 30°c.

DE N°: 10/11A071/366

NE PAS LAISSER LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Fabricant détenteur de DE : 4 A SANTE INDUSTRIE Zone d'activité Oued Fodda - Chlef

جينوفازول® 150 ت.م.

نبترات الإكونازول 150 ملغ

تحميلات مهبلية ذات تحرير متواصل.

التعريف بالدواء :

التركيب :

نبترات الإكونازول :150 ملغ

السواغ : بوليسكاريد، جلاكتومانان، سيليس كولويدال عديم الماء

جليسيريدات نصف مركبة صلبة، هيننتنوات السترائيل لتحميلة مهبلية واحدة.

التعبئة :

علبة من تحمية مهبلية واحدة ذات تحرير متواصل.

الصنف :

ضد الخمج ومظهر مهبلي.

دواعي الإستعمال :

يستعمل هذا الدواء في معالجة الأمراض الموضعية الناتجة عن فطريات المهجرية التي تصيب الأعضاء التناسلية الخارجية و المهبل.

تحذير :

الحالات التي لا يستعمل فيها هذا الدواء :

ينبغي عدم إستعمال هذا الدواء في حالة الحساسية لإحدى مكونات الدواء أو لإحدى المواد المنسوبة إليه، أو في حالة إستعمال واقيات ذكرية أو لولب

في حالة الشك يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة :

- إن العلاج الموضعي للفطر ليس سوى جزء من علاج متكامل، على الطبيب إجراء فحوصات لمعرفة العوامل المسببة من أجل تجنب عودة الإصابة مجددا.

تحذيرات الإستعمال :

تجنبي إستعمال الصابون الذي يحتوي على الحوامض عند الإغتسال (فالحوامض تساعد على تكاثر الفطر). (أنظر نصائح عملية ضمن فقرة : طريقة الإستعمال).

قد يتسبب العلاج بحرارة موضعية و حكاك متزايد، بصورة عامة، تختفي هذه الأعراض مع مواصلة العلاج. إستشيري طبيبك في حال إستمرار هذه الأعراض لمدة تتجاوز 24 إلى 48 ساعة في حالة الشك لا تترددى بإستشارة الطبيب أو الصيدلي.

التداخلات الدوائية و غيرها من التداخلات :

لنفادي حدوث تداخلات بين الأدوية، يجب تلقائيا إحاطة الطبيب أو الصيدلي علما بكل دواء أو علاج آخر تستعمليه.

لا تستعملي هذا الدواء بالتزامن مع مستحضرات منوية (بسبب إمكانية تعطيل مفعول الدواء) أو في حال إستعمال لولب.

حالات الحمل و الرضاعة :

يمكن للمرأة الحامل إستعمال هذا الدواء في حالة الضرورة و لكن بعد إستشارة الطبيب.

في حال إكتشفت أنك حامل أثناء العلاج، إستشيري الطبيب لكي

يقرر متابعتك للدواء أم لا.

يمكنك الرضاعة خلال إستعمال هذا الدواء.

بشكل عام، من المحبذ إستشارة الطبيب أو الصيدلي دائما خلال فترة الحمل و الرضاعة قبل إستعمال أي دواء.

كيفية إستعمال هذا الدواء :

المقادير :

في أغلب الأحيان تستعمل تحميلة مهبلية واحدة مساء قبل النوم لمدة في بعض الحالات، يمكن لطبيبك أن يصف لك تحميلة واحدة ليلا تحميلة أخرى في صباح اليوم الموالي.

طريقة الإستعمال :

عن طريق المهبل.

يفضل التمدد و إدخال التحميلة المهبلية بعمق داخل المهبل، إن أسهل طريقة للقيام بذلك هي بالتمدد على الظهر مع ثني وفتح الركبتين.

نصائح عملية :

- إستعملي صابون ذو PH معتدل أو قلوي عند الإغتسال

- إستعملي أدوات خاصة بك عند الإغتسال لتفادي نشر العدوى في محيطك (قفاز - منشفة).

- بإستطاعة طبيبك :

- أن يعالج شريك الجماع حتى لا ينقل لك العدوى مجددا.

- أن يصف لك مضاد للفطريات يستعمل موضعيا.

- إرتدي ملابس داخلية قطنية.

- تجنبي الحمامات المهبلية.

- لا توقفي العلاج خلال الحيض.

- لا تستعملي قطيلات داخلية أثناء العلاج.

أوقات إستعمال هذا الدواء :

يفضل إستعمال هذا الدواء مساء قبل النوم.

التأثيرات الجانبية و الأعراض المزعجة :

مثل كمل مستحضر نشط، قد يؤدي تناول هذا الدواء لدى بعض الأشخاص إلى حدوث ردات فعل متفاوتة الإزعاج :

- كالإحساس بحرارة موضعية، تخرششات، حكاك، طفح جلدي (إحمرار البشرة).

- درماتيت الإتصال (إتهاب البشرة)، شري (طفح جلدي مع حكة). لا تتردد في بإستشارة الطبيب أو الصيدلي و التبليغ عن كل أثر غير مرغوب فيه و مزعج لم يتم ذكره في هذه النشرة.

الحفظ :

لا يجوز إستعمال هذا الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العلبة.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

قرار التسجيل رقم : 10 / 11A071 / 366

يحفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال
--

المنتج صاحب الرخصة : 4 أ صحة صناعة

المنطقة الصناعية وادي الفضة - الشلف