

NIFLURIC® 700 mg

Morniflumate-suppositoire

Nifluric® adulte 700 mg ; suppositoire.

Boîte de 10.

Composition : La substance active est le morniflumate : 700 mg.

Excipients : Glycéride hémi synthétique solidés... Quantité suffisante pour un suppositoire.

Dans quel(s) cas utiliser ce médicament :

Ce médicament est préconisé chez l'adulte et l'enfant à partir de 12 ans:

- en traitement de longue durée de :
- antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide nilflumique ou de substance d'activité proche, notamment autres anti inflammatoires non stéroïdiens, aspirine.
- en traitement de courte durée de douleurs aiguës d'arthrose, et de certaines inflammations du pourtour des articulations tels que tendinites, bursites.

Informations nécessaires avant de prendre Nifluric® 700mg, suppositoire :

NIFLURIC ADULTE 700mg, suppositoire NE DOIT PAS ETRE

UTILISER dans les cas suivants :

-au delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée).
-antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide nilflumique ou de substance d'activité proche, notamment autres anti inflammatoires non stéroïdiens, aspirine.
-antécédents d'allergie aux autres constituants du suppositoire.
-ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution.
-maladie grave du foie.
-maladie grave du reins.
-maladie grave du coeur.
-inflammation ou saignement récents du rectum.
La forme adulte est contre indiquée chez l'enfant de moins de 12 ans.

Précautions particulières d'emploi :

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical.

En cas d'infection, la surveillance devra être renforcée.

AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE

MEDECIN EN CAS :

-d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
-de maladie du coeur, du foie ou du rein,
-de varicelle, ce médicament est déconseillé en raison d'exceptionnelles infections graves de la peau.
-d'asthme : la survenue de crise d'asthme chez certains patients peut être liée à une allergie à l'aspirine ou à un anti inflammatoire non stéroïdien; dans ce cas, ce médicament est contre indiqué.

AU COURS DU TRAITEMENT :

-en cas d'hémorragie gastro-intestinale, (rejet de sangpar la bouche ou dans les selles, coloration des selles en noir), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.
-en cas de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme ou brusque gonflement du visage et du cou (cf. Effets indésirables), ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

Grossesse : Au cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée soit 12 semaines après le 1er jour de vos dernières règles), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.
de 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au delà de 5 mois de grossesse révolus (au delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur le plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de 5 mois révolus, parlez en à votre gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.

clie de 10 suppositoires.

التركيب:

المادة الفعالة هي مورنيلفلومات : 700 ملغ.

المكونات الأخرى هي:

جليسيرينات صلبة شبه تعليفية ... كمية كافية لتسييملة واحدة

ما هي الحالات التي يستعمل فيها هذا الدواء:

يستعمل هذا الدواء لدى البالغين و الأطفال ابتداءً من 12 سنة من العمر:

-للمعالجة طويلة المدى:

* في بعض الحالات الرئوية الالتهابية المزمنة.

يعيش أمراض المفاصل.

-معالجة قصيرة المدى لبعض الآلام العادة للإتهاب المفاصل أو لبعض

الالتهابات حول المفاصل كإلتهاب الوتر و إتهاب الجراب.

معلومات ضرورية قبل أخذ نيفلوريك للبالغين 700 ملغ : تحيلات:

يجب الإمتناع عن إستعمال نيفلوريك للبالغين 700 ملغ، تحيلات في الحالات الآتية:

-بعد نهاية الشهر الخامس من الحمل (24 أسبوع من إنقطاع الطمث).

-سواق حساسية أو ربو ناتجة عن تناول هذا الدواء، أو دواء مشابه، بالأخص

مضادات الإتهاب غير الستيرويدية الأخرى و الأسيرين.

-سواق حساسية لأحد المكونات الأخرى التحميلة.

-القرحة المعدية أو الإثنا عشرية النشطة.

-مرض وحمى في الكلى أو الكبد أو القلب.

-الإتهاب المستقيم أو تزيف حديث للمستقيم.

-الأطفال دون 12 سنة من العمر.

-إحتياطات الإستعمال :

تناول هذا الدواء يحتاج إلى متابعة طبية.

في حالة التعفن ، ينبغي مضاعفة الرقابة.

قبل تناولكم هذا الدواء، عليكم بمراجعة الطبيب في حالة وجود:

-سواق هضمية (فتق فوهي، تزيف هضمي،قرحة معدية أو إثنا عشرية

قديمة).

-مرض في القلب أو الكبد أو الكلى.

- جاذري الماء ، يصبح بعدم إستعمال هذا الدواء بسبب تعفنات جلدية دائرة.

- ربو : حدوث نوبة ربو عند بعض المرضى قد يكون سببا حساسية للأسيرين

أو لحاد الإتهاب غير ستيرويدي، في هذه الحالة يجب إستعمال هذا الدواء.

أثناء العلاج:

-في حالة التزيف الهضمي (القيء الدموي أو دم في البراز، تلون البراز

بلون داكن)، يجب وقف العلاج بهذا الدواء، والإتصال بطبيب أو مركز

لإستجالات.

- في حالة ظهور أعراض حساسية ضد هذا الدواء، خاصة توبة

الربو أو التورم المفاجيء، للوجه و العنق (أنظر فقرة «ما هي التأثيرات غير

المرفوعة للمحتمل ظهورها«)، يجب وقف العلاج والإتصال بالطبيب أو

مركز الإستجالات.

الحمل : خلال الثلاث أشهر من الحمل (12 أسبوع من إنقطاع الطمث،

أي 12 أسبوع بعد أول يوم من آخر دورة شهرية لك، قد يوصف لك

إبتداءً من النصف الثاني للشهر الثالث إلى نهاية الشهر الخامس من الحمل،

(من 12 إلى 24 أسبوع من إنقطاع الطمث) ينبغي عدم إستعمال هذا الدواء

إلا بأمر الطيب و لمدة وجيزة، ولا ينبغي إستعمال هذا الدواء مطولا.

بعد نهاية الشهر الخامس من الحمل (بعد 24 أسبوع من إنقطاع الطمث)،

يجب الإمتناع عن تناول هذا الدواء، مهما كانت الحالة لأن تأثيرته على

طفلك قد تؤدي إلى تبعات وخيمة و بالأخص على مستوى القلب،الرئة،

الكلى، حتى لو كانت جرعة طارئة.

إذا كنت حاملا وتناولت هذا الدواء بعد نهاية الشهر الخامس من الحمل.

عليك إبلاغ طبيبك ، أخصائي الأمراض النسائية و التوليد، ليرشدك إلى التدابير

نيفلوريك® 700 ملغ

مورنيلفلومات - تحيلات

المناسبة الواجب إتباعها.

الإرهاق : هذا الدواء ينتقل إلى حليب الأم، من باب الحيطة يوصى بعدم

إستعماله أثناء فترة الإرضاع.

عليك بإستشارة طبيبك أو الصيدلاني قبل إستعمالك أي دواء.

قيادة المركبات و العمل على الآلات :

في حالات نادرة قد يسبب تناول هذا الدواء دوارا و تعاسا.

تناول أو إستعمال ملاحات أخرى:

عليكم بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن كل علاج آخر تتناولونه أو تناولتموه مؤخرا و بالأخص مضادات الإتهاب غير الستيرويدية الأخرى، مضادات

التخثر الفموية، الأسيرين ومشتقاته، الهيبارين، الليثيوم، الميتوتريكسات

بجرعات كبيرة، خاصة إذا كان دواء حصلتكم عليه بدون وصفة طبية.

كيف يستعمل نيفلوريك للبالغين 700 ملغ، تحميلة:

مخصص للبالغين و الأطفال البالغ أعمارهم 12 سنة من العمر فما فوق.

عادة تحميلة واحدة صباحا والأخرى مساءً.

عن طريق المستقيم.

نظرا لإحتمال حدوث تعرض موضعي إضافة إلى مخاطر الإستعمال عن طريق

الفم، يجب أن تكون المعالجة بالتحاميل لأقصر مدة ممكنة.

إذا شعرتم بأن تأثير نيفلوريك للبالغين 700 ملغ، تحميلة مغاير لما توقعتم،

عليكم بمراجعة الطبيب أو الصيدلي.

إذا إستعملتم أكثر من تحميلة من نيفلوريك للبالغين 700 ملغ : يجب مراجعة

الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيتم أخذ نيفلوريك للبالغين 700 ملغ : يجب عدم مضاعفة التحيلات

عند الإستعمال للتعويض التحميلة المنسية.

ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة:

مثل كل دواء، قد يسبب نيفلوريك للبالغين 700 ملغ، تحميلة عند بعض

الأشخاص تأثيرات غير مرغوبة.

-بعض هذه التأثيرات نادرة لكنها وخيمة، ينبغي حتما توقيف العلاج و إبلاغ

الطبيب في حالة:

-حساسية كرد فعل:

* في الجلد على شكل طفح جلدي، حكة، رد فعل شديد عند التعرض لأشعة

الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، نادرا آفة قفصية على الأفضية

المخاطية أو على الجلد.

*في الجهاز التنفسي من نمط توبة ربو.

*عامّة من نمط الصدمة التحسسية.

-تزيف هضمي (وجود دم في القيء، أو البراز، براز بلون داكن).

هذه الطاهرة تكون أكثر حدوثا كلما زادت الجرعة.

-إستنشائيا، تعفنات جلدية وخيمة لوحظت عند الإستعمال في حالة جاذري

الماء.

بالإضافة، لقد لوحظ حالات تفرح إثنا عشري و حدوث قلوب هضمية.

بعض التأثيرات الأخرى تحتاج إلى إبلاغ الطبيب، هو وعده المؤهل لتحديد ما يجب عمله في حالة:

-الإضطرابات الهضمية مثل ألم البطن، القيء، الغثيان، إختلال في الإفرغ.

قد لوحظ تلف في العظام بعد معالجة طويلة لسنوات عدة بجرعات

كبيرة (التسمم الفلوري).

بعض التغيرات الحيوية قد تستوجب مراقبة صيغة الدم ووظائف كل من

الكبد، الكلى.

يجب إحاطة الطبيب أو الصيدلي علما بكل تأثير غير مرغوب تلاحظونه

غير مذكور في هذه النشرة.

كيف يحفظ نيفلوريك للبالغين 700 ملغ، تحميلة:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

يجب عدم تركه في متناول أيدي أو مرآى الأطفال.

يجب عدم إستعماله بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية المذكور على العلبة

رقم مقرر التسجيل: 10/04B 030/366

صنع من طرف : ما صحة للصناعة

شارع سي بلعيد واد القفصة ولاية الشلف