

SERTAZOLE® 300mg
Nitrate de sertaconazole
Ovules gynécologiques

FORME ET PRESENTATION :
Ovule, boîte de 01.

COMPOSITION :
Nitrate de sertaconazole300 mg
Excipients : glycérides hémi-synthétiques solides, silice colloïdale anhydre q.s.p un ovule.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :
ANTIFONGIQUE LOCAL (G: système génito-urinaire et hormones sexuelles).

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
Ce médicament est indiqué dans le traitement local des candidoses (affections dues à des champignons microscopiques) de la muqueuse vaginale.

ATTENTION !
DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- En cas d'allergie à un antimycosique du groupe des imidazolés ou à l'un des excipients.
- En cas d'utilisation avec des préservatifs masculins ou des diaphragmes en latex.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES :
Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du traitement. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs favorisants par votre médecin est indispensable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Ne pas utiliser un savon acide pour l'hygiène locale (l'acidité favorisant la prolifération des champignons) (cf. Conseils pratiques de la rubrique : comment utiliser ce médicament).
En cas d'intolérance locale ou de réaction allergique, le traitement sera interrompu.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

INTERACTIONS :
Contre-indiquées :
Préservatifs et diaphragmes en latex : risque de rupture du préservatif ou du diaphragme.

Déconseillées :
Spermicides : tout traitement local vaginal est susceptible d'inactiver une contraception locale spermicide.

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
En raison d'un passage systémique extrêmement faible, l'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie :
Un ovule en administration unique, le soir au coucher.

Mode et voie d'administration :
Voie vaginale. Introduire un ovule profondément dans le vagin, de préférence en position allongée.

Conseils pratiques :
- toilette génitale externe avec un savon à pH neutre ou alcalin ;
- le traitement s'accompagnera de conseils d'hygiène (port de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales...) et dans la mesure du possible, de la suppression des facteurs favorisants ;
- pour traiter les extensions vulvaires ou périanales de la mycose, il est recommandé d'associer aux ovules gynécologiques une crème antifongique appliquée localement ;
- le traitement du partenaire se discutera en fonction de chaque cas ;
- le traitement ne sera pas interrompu pendant les règles.

Fréquence d'administration
L'ovule doit être administré de préférence le soir au coucher.

Durée du traitement
La durée du traitement est théoriquement de 1 jour. Toutefois, en cas de persistance des signes cliniques, votre médecin pourra vous prescrire à 7 jours d'intervalle, un second ovule.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :
Comme tout produit actif ce médicament peut chez certaines personnes, entrainer des effets plus ou moins gênant : rares manifestations d'intolérance locale (sensations de brûlures ou d'exacerbation du prurit disparaissant généralement avec la poursuite du traitement), possibilité d'allergie.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
Tenir à l'abri de la chaleur.

Date de mise à jour de la notice : 11/2015

D.E N° : 16/11 A 085/366

NE PAS LAISSER LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Fabricant, conditionneur et détenteur de D.E :
4 A SANTE INDUSTRIE
Zone d'activité Oued Fodda - Chlef.