

METROFAGYL® 500

Métronidazole 500 mg
Ovules gynécologiques

COMPOSITION :

Métronidazole 500 mg
Excipients : Glycérides hemi-synthétiques . q.s.p. 1 ovule

DANS QUEL CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines infections du vagin (vaginites à Trichomonas vaginalis et vaginites non spécifiques).

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est réservé à l'adulte.

Voie vaginale. L'ovule s'administre généralement le soir, au coucher, en position allongée.

Posologie :

- Vaginites à Trichomonas vaginalis : 1 ovule par jour, à mettre au fond du vagin pendant 10 jours, en association avec un traitement par voie orale.

- Vaginites non spécifiques : 1 ovule par jour, à mettre au fond du vagin pendant 7 jours, en association avec un traitement par voie orale si nécessaire.

Votre partenaire doit être traité simultanément même sans présenter de signes cliniques.

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Metrofagyl® ovule ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à l'un des composants du produit ou à une substance apparentée (dérivés imidazolés).

MISE EN GARDE ET PRECAUTION D'EMPLOI :

Si pour des raisons impératives, Metrofagyl® ovule doit être administré pour une durée plus longue que celle recommandée, un examen hématologique régulier est conseillé, notamment la formule leucocytaire (globules blancs). Ces patients doivent être étroitement surveillés en raison du risque d'apparition d'effets indésirables tels que confusion mentale, tremblements, ataxie (mauvaise coordination des mouvements volontaires) et crise convulsives.

La prise de boissons alcoolisées est déconseillée durant le traitement et au moins le jour suivant l'arrêt du traitement en raison de l'effet antabuse (rougeur, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque).

Un traitement par le métronidazole ne doit pas être prescrit pendant plus de 10 jours et ne doit pas être répété plus de 2 à 3 fois par an.

Les patients atteints d'affections neurologiques sévères aiguës ou chroniques risquent de voir leur état s'aggraver.

Une coloration brun-rougeâtre des urines, sans conséquence, peut être observée lors du traitement. Le métronidazole doit être administré avec précaution chez les patients souffrant d'une encéphalopathie hépatique.

L'utilisation simultanée de Metrofagyl® ovule avec des préservatifs ou un diaphragme peut augmenter le risque de rupture du latex.

INTERACTION MÉDICAMENTEUSE ET AUTRES

INTERACTIONS

Pour éviter toute interaction éventuelle avec d'autres médicaments, il convient d'informer le médecin ou le pharmacien de tous les autres traitements en cours. Le métronidazole ne doit pas être utilisé en association avec le disulfirame, l'alcool et des médicaments contenant de l'alcool.

Le métronidazole peut aussi interagir avec les molécules suivantes : les anticoagulants (surveiller le taux de prothrombine, et le cas échéant ajuster la posologie de l'anticoagulants en cas d'augmentation du risque hémorragique), le lithium, la ciclosporine, la phénytoïne et le phénobarbital (diminution du taux plasmatique du métronidazole), le 5-flourouracil.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Le métronidazole passe dans le placenta, en cas d'allaitement, il est déconseillé de prendre ce médicament en raison de son passage dans le lait maternel.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Ils sont rares avec les ovules. Troubles digestifs : crampes abdominales, nausées, vomissements, diarrhées, inflammation de la bouche, altération du goût, perte d'appétit, cas exceptionnels et réversibles d'inflammation du pancréas.
- Réactions allergiques : prurit, démangeaisons, bouffées de chaleur, urticaire, fièvre, œdème de Quincke, choc anaphylactique.
- Troubles du système nerveux central et périphérique : neuropathie sensoriale périphérique, maux de tête, vertiges, convulsions, ataxie ?
- Troubles psychiatriques : désordres psychotiques avec confusion et hallucination.
- Troubles visuels : troubles transitoires de la vue avec diplopie (perception d'une vision double) ou myopie.
- Troubles sanguins : très rares cas d'agranulocytose, neutropénie et thrombocytopénie.
- Foie : très rares cas d'anomalies des tests de la fonction hépatique et hépatites choléstatiques réversibles.

CONSERVATION

Ne pas conserver à plus de 25° C

Boîte de 10 ovules

D.E. N° : 07/11A 002/366

NE PAS LAISSER LES MÉDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Fabricant détenteur de DE : 4 A SANTE INDUSTRIE
Zone d'activité Oued Fodda - Chlef

مترو فاجيل® 500

ميترونيڊازول 500 ملغ

تحميلات مهبلية

التركيب

ميترونيڊازول : 500 ملغ
السواغ : غليسيريدات نصف مركبة صلبة : ك.ك.لتحميله مهبلية.

متى يستعمل هذا الدواء ؟

مخصص للبالغات .

عن طريق المهبل، عادة في المساء قبل الذهاب للنوم، تدخل التحميلة و المريضة مستلقية.

يوصى باستعمال هذا الدواء للمعالجة الموضعية في بعض إخماج المهبل : التهاب المهبل الناتج عن المشعرات المهبلية و التهابات المهبل غير النوعية.

كيف يستعمل هذا الدواء ؟

– التهاب المهبل بالمشعرات : تحميلة واحدة في اليوم تدخل إلى مؤخر المهبل و ذلك لمدة 10 أيام مشاركة مع المعالجة بالميترونيڊازول عن طريق الفم إذا لزم الأمر.

– يجب في نفس الوقت معالجة الزوج سواء كان هناك أعراض موجودة أو غير موجودة.

متى لا يستعمل هذا الدواء ؟

يمنع استعمال هذا الدواء عند المرضى الذين سبق أن اشتكوا من حالة تحسس للميترونيڊازول أو لإحدى مكونات السواغ أو لأي دواء آخر يتحوي مشتقات الإيميدازول.

التحذيرات و إحتياطات الاستعمال.

في الحالات التي تستلزم إعطاء الميترونيڊازول لمدة أطول من تلك الموصى بها يجب بانتظام إجراء فحوصات مخبرية للدم على الأخص لصيغة الكريات البيضاء و إخضاع هؤلاء المرضى للمراقبة الحثيثة لاحتمال حدوث تأثيرات غير مرغوبة مثل الإختلاط الذهني و الدوار و الهزع (إضطراب في تناسق الحركات الارادية) و النوبات الإختلاجية.

يوصى بعدم تناول المشروبات الكحولية طول مدة العلاج و في اليوم التالي على الأقل لوقف العلاج تفاديا لرد فعل (احمرار الوجه و حرارة و تسرع القلب) يجب عدم تجاوز مدة العلاج بالميترونيڊازول عن 10 أيام و لا تكرارها أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة. كذلك ينبغي الحذر عند المرضى باضطرابات عصبية شديدة حادة أو مزمنة. قد يلاحظ أثناء المعالجة تلون البول بلون أحمر داكن و ليست لهذه الظاهرة أية أهمية. يجب إعطاء الميترونيڊازول بحذر لدى المرضى المصابين باعتلال دماغي كبدي. استعمال تحميلات مترو فاجيل مع رفال الذكر أو الحجاب الواقي من الحمل قد يزيد من احتمال تعرض الواقي المطاطي للتمزق.