

®

# GLYCERINE - Bébés - Enfants - Adultes Suppositoire

## Forme et présentation :

Boite de 10 suppositoires

Composition qualitative et quantitative :

	Bébés	Enfants	Adultes
--	-------	---------	---------

Glycérine .....	0,642g .....	1,23g .....	2,04g
-----------------	--------------	-------------	-------

Excipients : Gélatine, eau purifiée q.s.p .01 Suppositoire

## Indication :

- Laxatif par voie rectale.
- Traitement symptomatique de la constipation basse notamment par dyschésie rectale.
- Préparation aux examens endoscopiques du rectum.

## Mise en garde :

- Une utilisation prolongée est déconseillée.
  - Le traitement médicamenteux de la constipation n'est qu'un adjuvant au traitement hygiéno-diététique.
- Prendre une alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruits (boisson).
- La prescription de laxatifs par voie rectale (chez le bébé) doit être exceptionnelle, elle doit prendre en compte le risque d'entraver le fonctionnement normal du réflexe d'exonération.

## Contre indication :

Hypersensibilité à l'un des composants.  
En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Précaution d'emploi :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament dans certains cas de maladie Colique ou rectale.

## Interactions médicamenteuses et autres :

En cas d'augmentation du transit intestinal, la résorption des autres médicaments peut être diminuée.

## Effets Secondaires :

Un effet prolongé peut donner lieu à des sensations de brûlures anales et réctites congestives.

## Grossesse et allaitement :

En l'absence des données cliniques chez la femme enceinte ou allaitante, il est préférable de ne pas prendre ce médicament.

## Surdosage :

Aucun cas de surdosage de suppositoire à la glycerine n'a été rapporté.  
Cependant en cas d'utilisation prolongée risque accru de réctite et de diarrhée.  
Dans ce cas arrêt du traitement.

## Posologie et mode d'emploi :

### Bébés :

01 Suppositoire 5 à 30 mn avant l'heure choisie pour l'exonération (1 à 2 suppositoires par jour).  
Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction.

### Enfants :

Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'utilisation

### - De 2 à 6 ans :

01 Suppositoire 5 à 30 mn avant l'heure choisie pour l'exonération.

### - Plus de 6 ans :

01 Suppositoire 5 à 30 mn avant l'heure choisie pour l'exonération à renouveler éventuellement dans la demi heure ou l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.  
Le traitement de la constipation ne doit pas, au moyenne, dépasser 10 jours.

### Adultes :

01 Suppositoire 5 à 30 mn avant l'heure choisie pour l'exonération à renouveler dans la demi heure ou l'heure qui suite en cas de constipation rebelle.

## Conditions de Conservation :

A conserver à l'abri de la chaleur, et à température ne dépassant pas 25°C.

## DE Algérie :

15/10 M 199/366

15/10 M 200/366

15/10 M 201/366

- Date de mise à jour.

Se conformer à la prescription médicale

**NE PAS LAISSER LES MEDICAMENTS  
A LA PORTEE DES ENFANTS**

Fabricant conditionneur et détenteur de DE :

4 A SANTE INDUSTRIE

Zone d'activité Oued Fodda - Chlef

# غليسيرين<sup>®</sup> - رضع - أطفال - كبار

## غليسيرول

### تحميلات

#### التعبئة :

علبة تحتوي على 10 تحميلات.

#### تركيب :

رضع أطفال كبار

غليسيرول 0,642غ ..... 1,23غ ..... 2,04غ.

سواغ : جيلاتين، ماء مطهر، ك . ك . ل ..... 01 تحميلة

#### إفراط الجرعة :

لا يوجد أي حالة إفراط ناتجة عن تحميلة الغليسيرين تذكر، لكن في حالة الاستعمال المطول احتمال إتهاب المستقيم مع إسهال في هذه الحالة ينصح بوقف العلاج أو تخفيض في الجرعة.

#### الجرعة وطريقة الإستعمال : الرضع :

تحميلة واحدة 5 إلى 30 دقيقة قبل المواعيد المختارة للترز (تحميلة الى تحميتين في اليوم الواحد).

يمكن غطس التحميلة في الماء البارد لتسهيل عملية الدخول .

#### دواعي الإستعمال :

يستعمل هذا الدواء كمسهل.

- في حالات الإمساك المنخفضة خاصة تغوط المستقيم.  
- التحضير لبعض حالات فحص المستقيم.

#### الأطفال :

يمكن غطس التحميلة في الماء البارد لتسهيل عملية الدخول.

- من 2 الى 6 سنوات :

تحميلة واحدة 5 الى 30 دقيقة قبل المواعيد المختارة للترز.

- أكثر من 6 سنوات :

تحميلة واحدة 5 إلى 30 دقيقة قبل المواعيد المختارة للترز وإعادة 30 دقيقة الى ساعة إذا كان الإمساك شديد. علاج الإمساك لا يجب ان يتعدى مدة 10 أيام.

#### الكبار :

تحميلة كبار واحدة 5 الى 30 دقيقة قبل المواعيد المختارة للترز تجدد في 30 دقيقة او ساعة في حالة امساك شديد .

#### شروط الحفظ :

يحفظ هذا الدواء بعيدا عن الحرارة، و في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م

رقم مقرر التسجيل :

15/10 M 199/366

15/10 M 200/366

15/10 M 201/366

لا تتركوا الأدوية في متناول الأطفال

الصانع المعبأ و صاحب مقرر التسجيل: 4 أصحة صناعة المنطقة الصناعية وادي الفضة - الشلف

#### تحذيرات الإستعمال :

الإستعمال الدائم للدواء غير منصح به. علاج الإمساك بهذا الدواء ما هو إلا علاج مساعد لنظام غذائي نظامي معين.

يأخذ مع غذاء غني بمواد من أصل نباتي و إضافة عصير الفواكه. (سوائل).

إعطاء المستهلكات عن طريق الشرج (عند الرضيع) يجب أن يكون استثنائيا لكي لا يعيق العملية العادية للترز.

#### حالات عدم الاستعمال :

في حالة حساسية مفرطة لأخذ المكونات. في حالة الشك يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

#### إحتياطات الاستعمال :

من المستحسن عدم استعمال هذا الدواء في حالات مرض القولون او المستقيم.

#### التداخلات الدوائية و أخرى :

في حالة إرتفاع العبور المعوي، إمتصاص الأدوية الأخرى قد ينخفض.

#### الحمل و الرضاعة :

في غياب معطيات سريرية عند المرأة الحامل أو المرضعة، يستحسن عدم أخذ هذا الدواء.

#### التأثيرات الجانبية :

في حالات إستثنائية، الشعور بحروقات إحتقانية و في مستوي الشرج .