

FLUDAZOL[®]

2%

Flubendazole
Suspension buvable, flacon de 30 ml

1. QU'EST CE QUE FLUDAZOL ?

Forme et présentation:

Suspension buvable à 2g/100ml : Flacon de 30 ml, avec cuillère à mesure de 5 ml.

Composition:

Flubendazole..... 20 mg/ml,
Saccharose, carbomère (carbopol 974P), laurilsulfate de sodium,
parahydroxybenzoate de méthyle sodique [E 219], arôme banane,
hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Excipients à effet notoire: saccharose (1.4g/5ml), parahydroxybenzoate de méthyle sodique (9 mg/5ml)

Classe pharmaco-thérapeutique:

ANTHELMINTHIQUES.
Code ATC: P02CA05.

2. DANS QUELS CAS UTILISER FLUDAZOL ?

Indications thérapeutiques:

FLUDAZOL est utilisé pour le traitement des infestations par certains vers parasites du tube digestif: oxyure, ascaris, trichocéphale, ankylostome.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUDAZOL ?

Contre indications :

Allergie au flubendazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

Mises en gardes et précautions d'emploi:

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219) et peut provoquer des réactions allergiques.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Fludazol 2%, suspension buvable.
Ne pas utiliser chez les enfants de moins d'un an sans avis médical.

Interactions médicamenteuses:

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse et allaitement:

Par prudence, sauf avis contraire de votre médecin, il est préférable d'éviter la prise de flubendazole pendant la grossesse ou l'allaitement.
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

4. COMMENT PRENDRE FLUDAZOL ?

Posologie:

Elle dose recommandée est identique chez l'enfant et chez l'adulte. Elle dépend du ver infestant :

- Oxyure : 1 cuillère-mesure en prise unique. La prise sera renouvelée 15 à 20 jours plus tard afin d'éliminer totalement toute infestation. Des mesures d'hygiène rigoureuses corporelles (nettoyage des ongles, etc...) et vestimentaires doivent accompagner le traitement pour éliminer le risque de réinfestation.
- Ascaris, trichocéphalose, ankylostomiase : 1 cuillère-mesure matin et soir pendant 3 jours.

Mode d'administration:

Voie orale.

Ni purge, ni jeûne préalable ne sont nécessaires. Il n'y a pas lieu de prévoir un régime alimentaire particulier pendant le traitement.

Bien agiter la suspension buvable avant l'emploi.

Pour prendre FLUDAZOL 2 %, suspension buvable, utilisez la cuillère-mesure.

5. QUE FAIRE EN CAS DE SURDOSAGE ?

Si vous avez pris accidentellement une trop grande quantité de FLUDAZOL, consultez immédiatement votre médecin, par mesure de sécurité.)

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Risque de sevrage :

Sans objet.

6. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fréquent (moins de 1 patient sur 10) :

Douleur abdominale, diarrhée ;
Céphalées.

Peu fréquent (moins de 1 patient sur 100) :

Nausées, vomissements ;
Vertiges.

Rare (moins de 1 patient sur 1000) :

Réactions allergiques à type d'urticaire, éruption cutanée, gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), démangeaisons.

Conditions de conservation:

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Condition de délivrance : Médicament non soumis à prescription médicale.

Date de révision de la notice : Juin 2017

D.E N° : 19/19 B 005/503

NE PAS LAISSER LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Fabricant conditionneur et détenteur de D.E :
AFROPHARM
Ferme Munich lot N°6, Dar El Beida. Alger

فلودازول 2%

فلوبندازول

معلق للشرب، قئينة ذات 30 مل

1. ماهو فلودازول؟
الشكل والتقديم:

معلق للشرب ذو 2/100 مل : قابورة ذات 30 مل. مع ملعقة بقياس 5 مل.
الوكيب:

فلوبندازول 20 مل / مغ / مل.
السواغات:سكاروز، كربوميكر (كاربوبول 974P)، سفنات لوريل الصوديوم، ميثيل البارابين الصوديومي (E219) ، عطر الموز، هيدروكسيد الصوديوم، ماء منقى.
سواغات ذات تأثير معطوم: السكاروز (5/1.4 مل)، ميثيل البارابين الصوديومي (9مغ / 5مل)

الفئة الصيدلانية العلاجية:
طارد الديدان.
رمز ATC: P02CA05.

2. ماهي حالات استعمال فلودازول؟
توجيهات علاجية:

يستعمل فلودازول لعلاج الإصابات من بعض طفيليات الجهاز الهضمي : الأقصورة، الصفرة، السوطاء، الأوكستوما.

3. ماهي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال فلودازول؟

موانع الإستعمال:

حساسية اتجاه الفلوبندازول أو أحد المكونات الأخرى التي يحتويها هذا الدواء.

تنبيهات و احتياطات الإستعمال:

كوليرا حذرين عند تناول فلودازول:
يحتوي هذا الدواء على ميثيل البارابين الصوديومي (E219) و يمكن أن يتسبب في تفاعلات أرجية. لا ينصح باستعمال هذا الدواء لدى المرضى الذين لا يتحملون الفركتوز، متلازمة سوء امتصاص الفلوكوز و الغلاكتوز أو لديهم عجز في السكرال / الإيزومالتال (الأمراض الوراثية النادرة).
توجهوا إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول فلودازول 2% .محلون للشرب.
لا يستعمل لدى الأطفال الذين يقل سنهم عن سنة دون بيان طبي.

تداخلات بين الأدوية:

أعلموا طبيكم أو الصيدلي، إذا كنتم تتناولون أو تناولتم مؤخرا أو قد تتناولون أي دواء آخر.

الحمل والرضاعة:

يُفضل تفادي تناول الفلوبندازول أثناء الحمل أو الرضاعة كإجراء احتياطي ما لم يكن هناك رأي مخالف لطبيبكم.
إذا كنت حاملا أو مرضعة، أو تظنين أنك حاملا أو تخططين للحمل، اعلبي الصحبة من طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

4. كيفية تناول فلودازول؟

الجرعة وطريقة الإستعمال:
الجرعة:

بمائل الجرعة الموصى بها لدى الطفل و البالغ. حيث تتوقف على الدودة المنتشرة:
الأقصورة: ملعقة قياس واحدة في جرعة واحدة، يتم تجديد الجرعة بعد 15 إلى 20 يوم للقضاء كليا على المصوى.
يجب أن يصحب العلاج إجراءات صارمة للنظافة الجسدية (تنظيف الأظفار، إلخ...) و اللباسية قصد القضاء على خطر إعادة الإصابة.
الصفرة، داء المسلكات، داء الديدان الضخمة: ملعقة قياس واحدة صباحا و مساء خلال 3 أيام.

طريقة الإستخدام:

عن طريق الفم:

ليس من الضروري إفراغ المعدة بالمسهلات أو الصوم مسبقا، لا داعي للتخطيط لنظام غذائي خاص خلال العلاج.
يُرج معلق للشرب جيدا قبل الاستعمال.
لأخذ فلودازول 2% ، معلول للشرب، استعمالوا ملعقة القياس.

5. ما الذي يجب القيام به في حالة الجرعة المفرطة؟

إذا تناولتم كمية كبيرة من الفلودازول،عن طريق الخطأ، استشيروا طبيبك فوراً ، كإجراء أساسي.

تعليمات في حالة نسيان جرعة واحدة أو عدة جرعات:

لا تتناولوا جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيتم تناولها.

خطر الانتعاش

لا شين

6. ماهي الآثار غير المرغوب فيها المحتملة؟

على غرار جميع الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يتسبب في آثار غير مرغوب فيها، لكن لا تظهر بالضرورة عند الجميع.

المتكررة (أقل من مريض واحد من أصل 10):

آلم بطنية ، إسهال،

صداع.

قليلة التكرار (أقل من مريض واحد من أصل 100):

غثيان، تقيأ،

دوخة.

النادرة (أقل من مريض واحد من أصل 1000):

تفاعلات أرجية من نوع الشرى ، الطفح الجلدي، انتفاخ الوجه و الرقبة (وذمة كوينك)، الحكة.

شروط الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية.

لا يجب تجاوز التاريخ المحدد للاستعمال الظاهر على الغلاف الخارجي.

شروط الإصدار:

دواء غير خاضع للوصف الطبي.

تاريخ مراجعة النشرة: 2017/06

مقرر التسجيل رقم: 19/19 B 005/503

المنتج المعين و صاحب مقرر التسجيل :

أفرو فارم

حوش هنيش رقم 06، الدار البيضاء الجزائر .

لا تتحركوا الاثوية في متناول الأطفال